

泌尿器科

Q.尿の切れが悪く、後から漏れてきます。その原因とは？

恵心会 京都武田病院

▶下京区西七条南衣田町11 ▶市バス「西大路七条」停から徒歩3分、JR「西大路」駅から徒歩10分 ▶火・木・金午後、月・水・土日祝休


☎075(312)7001

京都武田病院

検索

30～40代の男性に多い排尿後尿滴下。トイレから出た後、少量の尿が漏れる症状です。原因の一つが肥満。おなか回りの脂肪がぼうこうを刺激するのです。

きつい下着や衣服を身に着けている場合は、尿道が圧迫されます。その状態だとうまく尿が出ず、排尿後に失禁してしまうことも。座って排尿した方が尿の切れはよくなりますよ。生活指導で肥満を改善したり、薬で治療を行うので、気軽に相談してください。



「排尿後尿滴下は前立腺の疾患から引き起こされる場合もあります。早めに相談を」と五十川義晃先生

診療時間	月	火	水	木	金	土	日	祝
9:30～12:00	休	●	休	●	●	休	休	休
13:30～16:00	休	休	休	休	休	休	休	休

■受付時間は8:30～12:00



Q.尿の切れが悪く、後から漏れてきます。その原因とは？

30～40代の男性に多い排尿後尿滴下。トイレから出た後、少量の尿が漏れる症状です。原因の一つが肥満。おなか回りの脂肪がぼうこうを刺激するのです。

きつい下着や衣服を身に着けている場合は、尿道を圧迫されます。その状態だとうまく尿が出ず、排尿後に失禁してしまうことも。座って排尿した方が尿の切れはよくなりますよ。生活指導で肥満を改善したり、薬で治療を行うので、気軽に相談して下さい。